

In patients with prostatic hypertrophy, anticholinergics may cause a decrease in maximal bladder pressure and volume and may occasionally result in the aggravation of dysuria.

IN CASE OF DOUBT CONSULT YOUR DOCTOR OR PHARMACIST.

PREGNANCY AND LACTATION

IN GENERAL DURING PREGNANCY AND BREASTFEEDING YOU MUST ALWAYS CONSULT YOUR DOCTOR OR PHARMACIST BEFORE TAKING ANY MEDICATION WHATSOEVER.

4- HOW TO USE THIS DRUG?

Dosage

Child 6-12 years

1 tablet three times daily

Adult

30-60 mg three times daily i.e 1 to 2 tablets daily. In acute colic, 90 mg as a single dose may be given.

Method and route of administration

Oral route

Swallow the capsule with a glass of water. Do not crush or crunch the capsules of their content as this would alter their properties.

Overdosage

If you have taken more FRIDIAL than you should

Empty the stomach by aspiration and lavage. A purgative saline should be given to promote peristalsis. Physostigmine salicylate (1 to 2 mg) should be injected intramuscularly, intravenously or subcutaneously to control the central and peripheral effects of anticholinergics.

5- SIDE EFFECTS

LIKE ANY OTHER ACTIVE PRODUCT THIS DRUG MAY CAUSE ADVERSE EFFECTS IN SOME PATIENTS.

Rarely: side effects are rare and include, dry mouth, constipation and disturbances of ocular accommodation. These symptoms however disappear by decreasing the dosage or discontinuing the medication.

INFORM YOUR DOCTOR OR PHARMACIST OF ANY OF OTHER ADVERSE EFFECT NOT MENTIONED IN THIS LEAFLET.

6- STORAGE

Store in dry place between 15-25°C.

Licence n°:

List II - Table C

This is a medicament

- A medicament is a product which affects your health, and its consumption contrary to instructions is dangerous
- Follow strictly the doctor's prescription, the method of use and the instructions of the pharmacist who sold the medicament
- The doctor and the pharmacist are experts in medicine, its benefits and risks
- Do not by yourself interrupt the period of treatment prescribed for you
- Do not repeat the same prescription without consulting your doctor

Keep medicaments out of the reach of children



Manufactured by the Laboratories TERIAK
CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

AP000/00

FRIDIAL® 30mg

Prifinium bromide

Film-coated tablets

1- IDENTIFICATION OF DRUG

Composition

Prifinium bromide 30 mg

Excipients: starch corn, lactose monohydrate, sodium croscarmellose, colloidal anhydrous silica, povidone, magnesium stearate, polyvinyl alcohol, macrogol, titanium dioxide, talc, erythrosine aluminium lacquer, indigo carmine aluminium lacquer q.s film-coated tablet,

Pharmaceutical form

Box of 10 film-coated tablets

2- WHEN TO USE THIS DRUG

Therapeutic indications

This drug is indicated in the treatment of :

Pain due to spasm and hypermotility of the gastro-intestinal tract :

- Gastritis
- Gastroduodenal ulcer
- Enteritis
- Colitis
- post-gastroectomy syndrome
- Irritable colon

Pain due to spasm and dyskinesia of the bile tract

- Cholecystitis
- Cholelithiasis

Pain due to pancreatitis.

Pain due to spasm of the urinary tract :

- Lithureteria
- Vesical tenesmus
- Cystitis
- Pyelitis

Premedication for gastric endoscopy and gastro-intestinal radiography.

Dysmenorrhea and vomiting.

3- ATTENTION!

WHEN NOT TO USE THIS DRUG?

Contra-indications

This drug SHOULD NOT BE USED in patients suffering from prostatic hypertrophy or glaucoma.

IN CASE OF DOUBT YOU MUST CONSULT YOUR DOCTOR OR YOUR PHARMACIST.

PRECAUTIONS

Anticholinergics are generally believed to have the possibility of raising the ocular pressure.



EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

GROSSESSE ET ALLAITEMENT

D'UNE FACON GENERALE, IL CONVIENT AU COURS DE LA GROSSESSE ET DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS DEMANDER CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

4- COMMENT UTILISER CE MEDICAMENT ?

Posologie

Enfants entre 6 et 12 ans

1 comprimé trois fois par jour.

Adulte

30-60 mg trois fois par jour soit 1 à 2 comprimés par jour. Dans la colique aigue, 90 mg peuvent être administré en dose unique.

Voie et mode d'administration

Voie orale.

Les comprimés doivent être avalés tels quels avec une boisson en quantité suffisante. Ils ne doivent pas être fractionnés, ni mâchés

Conduite à tenir en cas de surdosage

Si vous avez pris plus de comprimé que vous n'auriez dû.

Vider l'estomac par aspiration ou lavage. Un sel purgatif doit être administré afin de provoquer le péristaltisme. Les salicylates phisostigmine (1 à 2 mg) doivent être injectés en intramusculaire, intraveineuse ou sous cutané afin de contrôler les effets centraux et périphériques des anti-cholinergiques.

5- EFFETS NON SOUHAITES ET GENANTS

Effets indésirables

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MEDICAMENT PEUT CHEZ CERTAINES PERSONNES ENTRAINER DES EFFETS PLUS OU MOINS GENANTS :

Rares : sécheresse de la bouche, constipation, troubles de l'accommodation oculaire. Cependant ces symptômes disparaissent dès diminution ou interruption du traitement.

SIGNALER A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON SOUHAITE ET GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE.

6- CONSERVATION

Conserver dans un endroit sec et à température entre 15-25°C.

AMM N°:

liste II - Tableau C

CECI EST MEDICAMENT

- Un médicament est un produit, mais non comme les autres.
 - Un médicament est un produit qui agit sur votre santé et sa consommation non conforme aux prescriptions vous expose à un danger.
 - Respectez rigoureusement l'ordonnance de votre médecin et le mode d'emploi qu'il vous a prescrit.
 - Suivez les conseils de votre pharmacien.
 - Votre médecin et votre pharmacien connaissent le médicament, ses indications et contre-indication.
 - N'arrêtez pas de votre propre initiative le traitement durant la période prescrite.
 - Ne le prenez pas, n'augmentez pas les doses sans consulter votre médecin.

TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE LA VUE DES ENFANTS

AP000000

Fabriqu  par les Laboratoires **TERIAK**
 TERIAK CHEYLUS 1111 ZAGHOUAN

FRIDIAL® 30mg

Bromure de prifinium

Comprimés pelliculés

1- IDENTIFICATION DU MEDICAMENT

Composition

Bromure de prifinium 30 mg

Excipients : amidon de ma s, lactose monohydrat , croscarmellose sodique, silice colloïdale anhydre, povidone, st arate de magn sium, alcool polyvinyle, macrogol, dioxyde de titane, talc, laque aluminique d'erythrosine, laque aluminique d'indigo carmine q.s.p un comprim  pellicul .

Forme pharmaceutique

Boite de 10 comprim s pellicul s.

2- DANS QUELS CAS UTILISER CE MEDICAMENT ?

Indications th rapeutiques

Ce m dicament est indiqu  dans le traitement des :
 douleurs dues aux spasmes et l'hypermotilit  gastro-intestinale :

- Gastrite
- Ulc re gastroduod nal
- Ent rite
- Colite
- Syndrome post-gastrectomie
- Syndrome du c lon irritable
- Douleurs dues aux spasmes et dyskin sies des voies biliaires :
- Cholécystite
- Chol liithiase
- Douleur due   la pancr atite.

Dans les douleurs dues aux spasmes des voies urinaires :

- Lithiase urinaire
- T nesme v sical
- Cystite
- Py lite

Pr m dication pour une endoscopie gastrique ou radiographie gastro-intestinale.
 Dysm norrh e et vomissement.

**3- ATTENTION !
 DANS QUELS CAS NE PAS UTILISER CE MEDICAMENT ?**

Contre-indications

Ce m dicament NE DOIT PAS ETRE UTILISE chez les patients souffrant d'hypertrophie prostatique ou de glaucome.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRECAUTION D'EMPLOI

Les anti-cholinergiques augmentent g n ralement la pression oculaire. Chez les patients pr sentant une hypertrophie prostatique, les anticholinergiques peuvent affaiblir la pression maximale de la vessie, augmenter son volume et peuvent occasionnellement aggraver la dysurie.

